

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十九

詳校官太醫院醫士_臣舒岱

編修_臣倉聖脈覆勛

總校官原任中允_臣王燕緒

校對官原任編修_臣勵守謙

謄錄監生_臣沈立銘

欽定四庫全書

景岳全書卷五十八

明 張介賓 撰

熱陣

仲
理中丸

即名人參理中湯 治太陰即病自利

不渴陰寒腹痛短氣欬嗽霍亂嘔吐飲食難化胸膈
噎塞或瘧疾瘴氣瘟疫中氣虛損久不能愈或中虛
生痰等症

人參

白朮

炒

乾薑

炒

甘草

各三兩

右四味搗篩爲末蜜丸雞黃大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依數制用水八升煮取三升去渣溫服一升日三服○原論加減法詳在霍亂門述古條中實按右方兩數乃漢時權度今後世所用惟每味數錢而甘草半之酌宜可也

附子理中湯

二

治證如前而中氣虛寒腹痛甚者又

或入房腹痛手足厥冷或食冷犯寒等症

即前方加製附子一二三錢隨宜用之其有寒甚
勢急者不妨生用或炮用亦可○外科附子理中
湯有芍藥茯苓無甘草乾薑

附子理中丸

三

治陰寒腎氣動者

即前附子理中湯去白朮煉蜜丸服

理中加丁香湯

四

治中脘停寒喜辛物入口即吐即

噦

即前理中湯加丁香十粒甚或兼痛者可加至一

二錢 若以理中加木香即名木香理中湯

加味理中湯

五

治脾肺俱虛欬不已

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

半夏

乾薑

細辛

北五味

等分

右咀每服三錢薑三片棗一枚煎七分食遠服

局方胡椒理中湯

六

治肺胃虛寒氣不宣通欬喘逆氣

虛痞噎悶脇腹滿痛短氣不能飲食嘔吐痰水不止

白朮

五兩

乾薑

炙甘草

胡椒

良薑

華撥

陳皮

細辛

欬冬花

去梗各四兩

右咬咀每服五七錢水一鍾半煎七分食遠溫服○

或煉蜜丸桐子大每服三五十丸白湯溫酒米飲任

下無時每日二服

選方八味理中丸

七

治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶

或嘔吐泄瀉

人參

乾薑

炒各一兩

白朮

四兩炒

白茯苓

麥芽

炒二兩

甘草

炙

神麴

炒

砂仁

炒各一兩半

嚼下

右爲細末煉蜜爲丸每丸重一錢空心服一丸薑湯

枳實理中丸

治傷寒寒實結胸

人參

白朮

茯苓

甘草

乾薑

各二兩

枳實

十六片

右爲細末煉蜜丸雞子黃大每服一丸熱湯化下連
進二三服

理中化痰丸

九

治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或

大便不實飲食難化欬唾痰涎此中氣虛弱不能統
涎歸源也

人參

白朮

炒

乾薑

炮

茯苓

各二兩

炙甘草

一兩

半夏

制三兩

薑湯煮麴糊丸桐子大每服四五十九白湯送下

治中湯^十

治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或泄瀉

此即理中湯加青皮陳皮也

人參

白朮

乾薑_炮

炙甘草

青皮

陳皮

_{等分}

右每服五錢水煎服如嘔加半夏

丁香溫中湯^{十一}

治同前

即前治中湯加丁香去半夏

良方溫胃湯^{十二}

治憂思結聚脾肺氣凝元陽受損大

腸與胃氣不平脹滿上衝飲食不下脉虛而緊滿

附子

制

厚朴

當歸

白芍藥

人參

甘草

炙

陳皮

各一錢

乾薑

炮一錢

川椒

去合口炒出汗三分

水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

東垣

溫胃湯

十三

治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

白豆蔻

人參

澤瀉

各三分

益智

砂仁

厚朴

甘草

乾薑

薑黃

各四分

黃芪

陳皮

各七分

右爲細末每服三錢水一盞煎至半盞食前溫服

仲景

四逆湯

十四

又名通脉四逆湯○治傷寒陰症自

利裏寒外熱脉沈身痛而厥

甘草

炙二兩

乾薑

炮三兩

附子

一枚破八片生用

右㕮咀以水三升煮取一升二合分二次溫服其脉
即出者愈○面色赤者加蔥九莖○腹中痛者去蔥
加芍藥二兩○嘔者加生薑二兩○咽痛者加桔梗

一兩○利止脉不出者加人參一兩

仲景 四逆加人參湯 十五

治傷寒惡寒脉微而復利

即於前方內加人參一兩

仲景 四逆加豬膽汁湯 十六

治傷寒吐下後汗出而厥

四肢拘急脉微欲絕者

即於四逆湯內加入豬膽汁半合

仲景 茯苓四逆湯 十七

治傷寒汗下後病仍不解煩躁

者

茯苓

六兩

人參

一兩

甘草

炙二兩

乾薑

一兩半

附子

一枚生用去皮切八片

右五味以水五升煮取三升去渣溫服七合日三服

茱萸四逆湯

十八

治厥陰中寒小腹痛甚

吳茱萸

湯泡

附子

炮

乾薑

各二錢

炙甘草

錢半

水一鍾半煎七分熱服

韓氏

茵陳四逆湯

十九

治發黃脉沉細遲肢體逆冷腰

已上自汗

茵陳

二兩

炙甘草

一兩

乾薑

炮兩半

附子

一個炮作八片

右分四貼水煎服

仲景

當歸四逆湯

二十

治傷寒手足厥寒脉細欲絕者

或下利脉大腸鳴者虛也及其人內有久虛者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之

當歸

桂枝

芍藥

細辛

各三兩

甘草

通草

各二兩

大棗

二十五枚擘

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

四逆散

二一

方在散陣二八

治陽邪亢熱血脉不通四肢厥逆

仲景附子湯 二二

治少陰病得之一二日口中和其背

惡寒者當灸之附子湯主之并治少陰病身體痛手

足寒骨節痛脉沉者

附子

二枚去皮
破八片

人參

二兩

白朮

四兩

芍藥

茯苓

各三兩

右五味以水八升煮取三升去渣溫服一升日三服

三
附子湯 二三

治風寒濕痺骨節疼痛皮膚不仁肌

肉重著四肢緩縱

附子

生

白芍藥

桂心

甘草

白茯苓

人參

乾薑

各三兩

白朮 一兩

右㕮咀每服四錢水煎服

生附湯 二四

治寒濕腰痛

附子

生用

白朮

茯苓

牛膝

厚朴

乾薑

炙甘草

各一錢

蒼朮

杜仲

薑炒各二錢

水二鍾生薑三片紅棗二枚煎八分食前服

參附湯

二五

方在補陣三八

治元陽不足喘急呃逆嘔惡厥冷等證

仲景

朮附湯

二六

方在補陣四二

治中寒中氣不足逆冷痰盛口噤等證

芪附湯

二七

方在補陣四四

治氣虛陽弱虛汗倦怠

濟生 朮附湯 二八

方在補陣四三

治寒濕腰冷重痛小便自利

金匱 桂枝附子湯 二九

治傷寒八九日風濕相搏身體

疼煩不能轉側不嘔不渴脉浮虛而澁者

桂枝

四兩去皮

生薑

三兩切

附子

三枚炮去皮各破八片

甘草

三兩

大棗

十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去渣分溫三服

金匱 白朮附子湯 三十

治傷寒八九日風濕相搏身體

疼煩不能轉側不嘔不渴脉虛浮而濇若大便堅小便自利者去桂枝此方主之

白朮

二兩

附子

一枚炮去皮

甘草

炙一兩

生薑

一兩半切

大棗

六枚

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪即是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

金匱

甘草附子湯

三一

治風濕相搏骨節疼煩掣痛不

得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利大便反快
惡風不欲去衣或身微腫者此主之

甘草

炙

白朮

各二兩

附子

二枚炮
去皮

桂枝

四兩去皮

右四味以水六升煮取三升去渣溫服一升日三服
初服得微汗則解能食汗後復煩者服五合恐一升
多者服六七合爲妙

良方

薑附湯

三二

治霍亂轉筋手足厥冷或吐逆身冷

脉微急用此藥救之○此即仲景乾薑附子湯

乾薑

一兩

附子

一個生用

右每服半兩水煎○外科薑附湯有人參白朮

生薑附子湯

三三

治嶺南瘴癘內虛發熱或寒熱往

來嘔痰吐逆頭疼身痛或汗多煩躁引飲或自利小便赤兼主卒中風

附子

一枚如法製分四服

右每服水一鍾生薑十片煎六分微溫服

乾薑附子湯

三四

治瘴毒陰證發熱或煩躁手足冷

鼻尖冷身體重痛舌上胎生引飲煩渴或自利嘔吐
汗出惡風

大附子 一枚製分四服

右每服加炮乾薑二錢同煎溫服熱甚者冷服

^實鑑羌活附子湯 三五 治呃逆

羌活 附子 乾薑炮 茴香各一錢

木香五分

水鍾半棗二枚煎服○三因方木香作丁香

仲景芍藥甘草附子湯 三六

治發汗病不解反惡寒者

虛故也

芍藥

甘草

炙各三兩

附子

一枚炮去皮切八片

上三味以水五升煮取一升五合去渣分溫服

活人附子八味湯 三七

治氣虛中寒脚氣等症

附子

炮去皮臍

人參

乾薑

炮

芍藥

茯苓

甘草

炙

桂心

各二兩

白朮

四兩

右每服五七錢水一鍾半煎七分食前溫服○又方

去桂心加乾熟地黃三兩

六物附子湯 三八

方在外科三五

治四氣流注太陰四肢骨節煩疼浮腫小水不利

小建中湯 三九

方在補陣二二

治虛勞裏急腹痛失精四肢酸疼咽乾口燥等症

局方 大建中湯 四十

方在補陣二四

治陽虛氣血不足腰腳筋骨疼痛

八味大建中湯 四一

方在補陣二五

治中氣不足厥逆嘔吐孽急陰縮腹痛虛火等證

三建湯

四二

治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脉

沉微大小便數滑凡中風潮涎不省人事傷寒陰證
皆可用之

大附子

大川烏

天雄

各製用三錢

右用水二鍾薑十片煎一鍾不拘時或溫服或冷服

○自汗加桂浮小麥○氣逆加沉香○胃冷加丁香

胡椒

仲景炙甘草湯 四三

一名復脉湯 治傷寒脉結代心

動悸

炙甘草 四兩

生薑

桂枝 去皮各三兩

人參

阿膠 各二兩

生地黃 一斤

麥冬 去心半斤

麻子仁 半斤

大棗 十二枚擘

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去渣
內膠洋盡溫服一升日三服

仲景桂枝甘草湯 四四

治發汗過多其人又手自冒心

心下悸欲得按者

桂枝

四兩去皮

甘草

二兩

右二味以水三升煮取一升去渣頓服

陶氏
回陽返本湯

四五

治陰盛格陽陰極發躁渴而面

赤欲坐泥水中脉則無力或脉全微欲絕者○服後
脉微出者生頓出者死

人參

製附子

炮薑

炙甘草

五味子

麥冬

陳皮

臘茶

面戴陽者下虛也加葱七莖黃連少許用澄清泥漿水一鍾煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取汗爲效

華陀救脫陽方

四六

治寒中三陰口噤失音四肢強

直掣急疼痛似乎中風及厥逆唇青囊縮無脉或卒倒屍厥脫陽等證

先急用葱白一握微搗碎炒熱用布包熨臍下以二包更替熨之甚者仍灸氣海關元二三十壯脉漸出手足漸溫乃可生也

次用附子一個重一兩者切八片白朮乾薑各五錢木香二錢同用水二鍾煎一鍾候冷灌服須臾又進一服或煎服回陽等湯

仲景旋復代赭石湯

四七

治傷寒若汗或吐下解後心

下痞鞭噫氣不除者

旋復花

甘草

炙各三兩

人參

二兩

生薑

五兩切

代赭石

一兩

大棗

擘十二枚

半夏

半升洗

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服

一升日三服

仲景厚朴生薑甘草半夏人參湯

四八

治發汗後腹脹

滿

厚朴

炒

生薑

切各半斤

半夏

半斤洗

人參

一兩

甘草

二兩炙

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

簡易十味劉散

四九

治中風血弱臂痛連及筋骨舉動

艱難

附子

三兩炮

當歸

黃芪

炙

白芍藥

各二兩

川芎

防風

白朮

各兩半

肉桂

一兩

熟地

茯苓

各七錢半

右咬咀每服五七錢水鍾半薑八片棗三枚煎八分

食後臨臥服

奇效

芎朮湯

五十

治寒濕頭痛眩運痛極

川芎

附子

生去皮臍

白朮

各三錢

桂心

去皮

甘草

各一錢

水一鍾半生薑七片棗二枚煎八分食遠服

正元散 五二

治眩暈陽虛

紅豆 炒

乾薑 炮各三錢

人參

白朮

炙甘草

茯苓 各二兩

附子 炮去皮臍

川芎

山藥 薑汁炒

烏藥

乾葛 各一兩

川烏 炮去皮臍

肉桂 各五錢

黃芪 炙兩半

陳皮 二錢

右咬咀每服三錢水一鍾薑三片棗一枚入鹽少許

煎服

金匱 生薑半夏湯 五三

治胸中似喘不喘似嘔不嘔似

噦不噦徹心中憤憤然無奈者

半夏 半升

生薑汁 一升

右二味以水三升煮半夏取二升内生薑汁煮取一升半小冷分四服日三夜一服病止停後服

金匱 半夏乾薑散 五四

治乾嘔或吐逆痰涎

半夏 制

乾薑 炙等分

右二味杵爲散取方寸匕用漿水一升半煎取七合

去粗頓服之

仲景甘草乾薑湯

五五

治少陰傷寒小便色白吐逆而

渴動氣因下反劇身雖有熱反倦及肺痿吐涎沫而不欬口不渴小便數遺尿肺中冷上虛不能制下眩暈多涎唾等證○楊仁齋曰治男女諸虛出血胃寒不能引氣歸元無以收約其血者○良方名薑草湯治陰盛于陽寒而嘔血

甘草

炙四兩

乾薑

炮二兩

右咀以水三升煮取一升五合分溫再服○仁齋曰

等分每服三錢食前煎服

橘皮乾薑湯

五六

治惡心嘔噦

人參

乾薑

肉桂

各一錢

陳皮

通草

各錢半

甘草

五分

水一鍾半煎八分服

金匱

橘皮湯

五七

亦名生薑橘皮湯

治乾嘔噦若手

足厥者

橘皮

四兩

生薑

半斤

右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

萬氏橘皮湯

五八

方在痘疹九二

行滯消痰止嘔吐

金匱橘皮竹茹湯

五九

治噦逆

橘皮

二斤

竹茹

二升

生薑

半斤

甘草

五兩

人參

一兩

大棗

三十枚

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服

小半夏湯

六十

方在和陣八

治嘔吐及心下有飲者

三

丁香散

六一

治呃逆

丁香

柿蒂

各一錢

炙甘草

良薑

各五分

右爲末熱湯點服二錢不拘時

丁香煮散

六二

治翻胃嘔逆

丁香

石蓮肉

各十
四枚

北棗

七枚切
碎

生薑

七片

黃秫米

半合洗

水一碗半同煮稀粥去藥啜粥

簡易

丁香附散

六三

治反胃嘔逆粥食不下

大附子一枚坐於磚石上四面著火漸漸逼熱焯
入生薑汁中浸少時如法再焯約盡薑汁半碗許
爲度去皮焙乾爲末

丁香

二錢研

二味勻和每服二錢水一鍾粟米同煎七分服

楊氏

丁香茯苓湯

六四

治脾胃虛寒宿食留滯否塞疼

痛氣不升降以致嘔吐涎沫或嘔酸水不思飲食

半夏

制

橘紅

茯苓

各一兩半

丁香

附子

制

肉桂

砂仁

各五錢

乾薑炮

木香

各一兩

每服四錢水一鍾半薑七片棗一枚煎七分服

良方

丁香柿蒂散

六五

治吐利或病後胃中虛寒呃逆

凡呃逆至七八聲相連收氣不回者難治

丁香

柿蒂

炙甘草

良薑

各五分

人參

半夏

陳皮

茯苓
各一錢

生薑
二錢

水二鍾煎熱服

寶鑑丁香柿蒂散
六六

治呃逆嘔吐

丁香

柿蒂

青皮

陳皮
各等分

水一鍾半薑五片煎服

嚴氏柿蒂湯
六七

治胸滿呃逆不止

柿蒂

丁香
各二錢

加生薑五片水煎服○家珍方有人參一味

一百
安脾散 六八

治胃氣先逆飲食過傷憂思蓄怨宿

食癖積冷飲寒痰動擾脾胃不能消磨致成斯疾女
人由血氣虛損男子皆由下元虛憊有食罷即吐有
朝食暮吐暮食朝吐所吐酸黃臭水皆是脾敗惟當
速治遲則發煩渴大便秘水飲不得入口而危矣

南木香

磨汁

橘紅

人參

白朮

草果

麪煨

茯苓

甘草

炙

丁香

胡椒

各兩半

高良薑

一兩用陳壁土三合以水二碗同煮乾切片

右咀每服五錢水一鍾半入鹽少許煎七分食遠溫服或爲細末每服五錢用鹽米湯調下

三

補脾湯

六九

治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲

食不消

人參

白朮

茯苓

厚朴

炒

陳皮

各一錢

乾薑

炒

甘草

炙

草果

麥芽

炒各八分

水一鍾半煎七分空心溫服

三因養胃湯 七十

治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹疼腸

鳴泄瀉

藿香

厚朴 炒

半夏 制

茯苓 各錢半

草果

陳皮

人參

白朮 炒各一錢

附子 製八分

甘草 炙五分

水一鍾半薑三片棗二枚煎七分食遠服

胃愛散 七一

治脾胃久虛中焦氣滯或冷涎上壅嘔

吐惡心或胸膈疼痛不思飲食或泄瀉不止

人參

一兩

白朮

茯苓

黃芪

炙各三錢

丁香

甘草

炙各二錢

肉果

三個煨

乾薑

炒半兩

右用白米炒熟四兩同研爲末每服二三錢用薑湯
或人參湯調服 或爲呿咀每藥五七錢加炒米一
兩煎服亦可

東垣
藿香安胃散

七二

治脾胃虛弱不能進食嘔吐吞

酸脫痛不能腐熟

藿香

人參

陳皮 各一錢

丁香 五分

生薑 十片

水一鍾半煎七分食遠服

良方 七味人參丸 七三

治胃冷兼虛嘔逆不食服過砂

仁半夏丸不效可服此藥 方見和陣一三二

人參

白朮 炒各五兩

厚朴 薑制

北細辛 各四兩

生薑

橘皮 各三兩

桂心 二兩

右爲末煉蜜丸桐子大米飲下十丸漸加至二十丸

甘露湯

七四

治反胃嘔吐不止飲食減少常服之快

利胸膈調養脾胃進飲食○徐東臯曰常州一富人病反胃往京口甘露寺設水陸泊舟岸下夢一僧持湯一碗與之飲罷猶記其香味便覺胸膈少快早入寺知客供湯乃是夢中所飲者胸膈尤快遂求其方合數十服後疾遂瘥名曰觀音應夢散予得之常以待賓易名曰甘露湯又在臨汀療一人愈甚勿忽之

乾飭糟

頭柞者用六分

生薑

用四分

右和勻搗爛作餅或焙或晒乾每十兩入炙甘草二兩同研爲末每服二錢用沸湯入鹽少許調不拘時服

金匱

茯苓澤瀉湯

七五

治胃反吐而渴欲飲水者○外

臺治消渴脉絕反胃者

茯苓

半斤

澤瀉

生薑

各四兩

甘草

桂枝

各二兩

白朮

三兩

右五味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半

溫服八合日三服

仲景茯苓甘草湯 七六

治水飲停蓄心下甚者作悸作

利

茯苓

桂枝 各二兩
甘草 炙一兩
生薑 三兩

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

草薺薤湯 七七

和中調氣治嘔吐

草薺薤

藿香 各五分
陳皮
枳殼 各七分

白朮

山藥 各一錢
桂心
丁香 各二分

水一鍾半薑五片棗二枚粟米少許煎七分食前溫服

大順散

七八

治胃暑伏熱引飲過多以致寒濕傷脾

陰陽氣逆霍亂吐瀉藏府不調等症

乾薑

肉桂

杏仁

各四兩

甘草

三兩

右先將甘草微炒黃次入乾薑同炒令薑裂又入杏仁同炒令杏仁不作聲爲度却同肉桂研羅一處每用二三錢以水一鍾煎數滾溫服○如煩躁者以井

花水調服不拘時○此方加附子即名附子大順散

四順附子湯

七九

治霍亂轉筋吐瀉手足逆冷六脉

沈絕氣少不語身冷汗出

附子

生

白乾薑

炮

人參

甘草

炙各一兩

右咬咀每服四五錢水鍾半煎七分食遠服

醫

附子粳米湯

八十

治霍亂四逆多嘔少吐者

中附子

一枚制

半夏

制兩半

乾薑

炒

甘草

炙各一兩

大棗

十枚

粳米

五合

右㖞咀每服八錢水鍾半煎米熟去粗服

冷香飲子

八一

治傷暑暈霍亂腹痛煩躁脉沈微或

伏

附子

炮

陳皮

各一錢

草果

甘草

炙各錢半

水一鍾半薑十片煎八分井水頓冷服

集

成冷香湯

八二

治夏秋水濕恣食生冷陰陽相干遂

成霍亂臍腹刺痛脇肋脹滿煩躁引飲無度或感瘴

虛熱胸膈不利或嘔或泄並宜

良薑

白檀香

草薺麴包附子制

炙甘草

各一錢

丁香七粒

水一鍾半煎七分用井水浸冷於嘔吐時服之效或爲細末水調生麴糊丸如芡實大每服一丸新汲水磨下亦可

直指木瓜湯八三

治吐瀉不已轉筋擾亂

木瓜

一兩

茴香

微炒二錢半

吳茱萸

半兩湯炮

炙甘草

二錢

右咬咀分二服加薑五片紫蘇十葉空腹急煎服之

良方有生薑二錢五分無茴香甘草名木瓜煎

三因訶子散八四

治老幼霍亂一服即效

訶子炮去核

炙甘草

厚朴薑制

乾薑炮

神麴炒

良薑炒

茯苓

麥芽炒

陳皮

草薢等分

右爲細末每服二錢當病發不可忍時用水煎入鹽

少許服之

霍亂三方八五

治霍亂瀉利不止轉筋入腹欲死者

用生薑三兩搗爛入酒一升煮三四沸頓服

一方凡霍亂吐瀉不能服藥急用胡椒四十粒以飲吞之

一方凡霍亂吐瀉不止用艾一把水二升煮一升頓服之

千金霍亂方 八六

治霍亂乾嘔不止

以薤葉煎一升服三次立愈

乾霍亂二方 八七

凡欲吐不吐欲下不嘔嘔惡不止

者謂之乾霍亂

一方用鹽一兩生薑半兩搗同炒令色變以水一碗煎熱服

一方用丁香十四粒爲末以熱湯一盞調服

金匱苓桂朮甘湯 八八

治心下有痰飲胸脇脹滿目眩

茯苓 四兩

桂枝

白朮 各三兩

甘草 二兩

右用水六升煮取三升分三服小便即利

薑朮湯 八九

治心下停飲怔忡

白薑

白朮

白茯苓

半夏麴

各一錢

官桂

三分

甘草

五分

水一鍾半棗三枚煎服

韓氏溫中湯

九十

凡病人兩手脉沈遲或緊是皆胃

中寒也若寸脉短少及力少於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶腹中脹滿身體拘急手足厥冷急宜溫之

丁皮

丁香

各五分

厚朴

乾薑

陳皮

白朮

各一錢

水鍾半加葱白荊芥穗同煎

東垣厚朴溫中湯

九一

治脾胃寒滯心腹脹滿或見疼

痛

厚朴

薑炒

橘紅

乾薑

各一錢

茯苓

草薢

木香

甘草

各五分

水煎溫服

大正氣散

九二

方在和陣二四

治風寒濕氣傷脾心腹脹悶有妨飲食

強中湯

九三

治生冷寒漿有傷脾胃遂成脹滿有妨

飲食甚則腹痛

人參

橘紅

青皮

丁香

各二錢

白朮

錢半

附子

炮去皮
臍

草薢

乾薑

炮各一錢

厚朴

薑汁炒

甘草

炙各五分

水鍾半薑三片紅棗二枚煎七分不拘時服○嘔加

半夏○若傷麵食加萊菔子一錢

三因強中丸 九四

治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣

不升降○局方溫中化痰丸即此方不用半夏

高良薑

乾薑 炮

陳皮

青皮 各一兩

半夏

制二兩

右爲細末生薑汁煮糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

三生飲 九五

此治中風乃行經治痰之劑斬關奪門

之將必用人參驅駕其邪而補助真氣乃可用之否

則恐反爲害

生南星

一兩

生川烏

去皮
半兩

生附子

去皮
半兩

木香

二錢

每用一兩加人參一兩同煎服

嚴氏

三生丸

九六

治痰厥頭痛

南星

半夏

白附子

等分

右爲末薑汁浸蒸餅丸小豆大每服四十九食後薑

湯下

五生丸

九七

治風癰

川烏頭

附子

各生用
去皮臍

南星

生

半夏

生

乾薑

生各半兩

右爲細末醋煮大豆汁作麪糊和丸桐子大每服五

丸冷酒送下不拘時

局方溫中化痰丸

九八

治停痰留飲

陳皮

青皮

良薑

乾薑

等分

右爲細末醋煮糊丸桐子大每服三十丸空心米飲

送下

寶鑑溫胃化痰丸 九九

治膈内有寒脾胃傷飲胸膈不

快痰涎不已

半夏 制三兩

白朮

陳皮

乾薑 炮各一兩

右爲末薑汁糊丸桐子大薑湯下二十丸

局方倍朮丸 百

治五飲吞酸等證○一曰留飲停水在

心下○二曰澀飲水在兩脇○三曰痰飲水在胃中

○四曰溢飲水溢在膈○五曰流飲水在脇間瀝瀝

有聲皆由飲水過多或飲冷酒所致

白朮

炒二兩

桂心

乾薑

炒各一兩

右爲末蜜丸每服二十九溫米飲下加至三五十丸

食前服

明發

丁香半夏丸

百一

治心下停飲冷痰

丁香

半夏

制各一兩

人參

乾薑

炮

細辛

各五錢

檳榔

三錢

右爲細末薑汁糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

方局

丁香五套丸

百二

治胃氣虛弱三焦痞塞不能宣

行水穀故痰飲聚結嘔吐惡心脹滿不食

丁香

木香

青皮

橘紅

各半兩

白朮

茯苓

良薑

乾薑

各一兩

南星

制

半夏

制各二兩

右爲末湯浸蒸餅丸桐子大每服七十九丸溫湯下

三
因復元丹

百三

治脾腎虛寒發爲水腫四肢虛浮心

腹堅脹小便不通兩目下腫

附子

炮二兩

南木香

煨

茴香

炒

川椒

炒出汗

厚朴

制

獨活

白朮

炒

橘紅

吳茱萸

炒

桂心

各一兩

澤瀉

一兩半

肉苁蓉

煨

檳榔

各半兩

右爲末糊丸桐子大每服五十丸紫蘇湯不拘時送

下

薛氏加減金匱腎氣丸

百四

方在補陣一二六

治脾腎陽虛不能制水爲腫爲脹

濟生實脾散

百五

治陰水發腫宜先實脾土

附子

制

炮乾薑

厚朴

木香

大腹皮

草果仁

木瓜

各錢半

甘草

炙五分

水二鍾薑五片棗一枚煎七分不拘時服

嚴氏實脾散

百六

即前方加白朮茯苓

簡易腹脹方

百七

凡肚腹脹滿不能用藥者以獨蒜煨熟去皮綿裹納下部中冷即易之○又治闕格脹滿大小便不通亦

用上法氣立通○又方用生薑如指大一塊煨熟以
綿裹乘熱納下部中冷即易之

丁香止痛散

百八

治心痛不可忍

丁香

半兩

良薑

二兩

茴香

炒

甘草

各兩半

右爲末煉蜜丸桐子大每服二錢不拘時沸湯點服

勝金散

百九

治卒心痛

桂枝

元胡索

炒

五靈脂

當歸

各半兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服二十九食前陳皮湯送

下

良鐵刷散 百十

治心脾積痛婦人血氣刺痛酒病惡

心腸滑泄瀉

良薑 炒二兩

茴香 炒七錢

蒼朮 制

甘草 炙各二兩八錢

右爲末每服二錢空心薑鹽湯調下

局方蟠葱散 百十一

治男婦脾胃虛冷滯氣不行攻刺

心腹痛連胸脇膀胱小腸寒疝氣疝及婦人血氣刺痛

蒼朮

未泔浸切

炙甘草

各八錢

三稜

煨

蓬朮

煨

茯苓

青皮

各六錢

丁皮

砂仁

去殼

檳榔

各四錢

延胡索

三錢

乾薑

炒

肉桂

各二錢

右每服五錢水一盞入連根葱白一莖煎七分空心熱服或爲末用葱湯調服二三錢

寶鑑沉香桂附丸

百十二

治中氣虛寒飲食不美陰盛

陽虛藏府積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴便利無度而色不澤手足厥冷及下焦陽虛疝氣疼痛不

可忍腰屈不能伸喜熱熨稍緩等證

附子

炮去皮
臍

川烏

制同

沉香

肉桂

乾薑

炮

良薑

炮

茴香

炒

吳茱萸

炮各
一兩

右爲末醋煮麴糊丸桐子大每服五七十九食前米

飲下日二服忌生冷

椒附丸

百十三

治小腸虛冷小腹痛小便頻而清白

椒紅

炒

附子

炮

龍骨

桑螵蛸

炙

山茱萸

鹿茸

酒蒸焙各等分

右爲末酒糊丸桐子大每服六十丸空心鹽湯下

大沉香丸

百十四

治寒氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴

心痛

沉香

乾薑

炮

薑黃

桂心

檀香

各二兩

甘松

洗焙

白芷

天台烏藥

甘草

各半斤

香附

一斤

白荳蔻

三兩

右爲末煉蜜和丸彈子大每服一丸細嚼生薑湯下

不拘時

辨疑

桂附二陳湯

百十五

治寒瘧寒多熱少腰足厥冷

附子

炮

肉桂

半夏

制

白茯苓

陳皮

炙甘草

右咬咀每服五六錢水一鍾半薑三片棗一枚煎服

扶陽助胃湯

百十六

羅謙甫治崔運使長男雲卿年

二十五體肥養厚常食涼物寒藥以致秋間瘧發復

用水吞砒石等藥反增吐瀉中氣愈虛延至次年四

月復因勞怒前證大作診其脉得茲細而微手足稍

冷面色青黃食少痞悶嘔酸氣促汗出予思內經云
中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則爲
痿厥心悅又曰陽氣客于腸胃之間則卒然而痛非
大熱之劑不能愈遂制此方

附子

炮去皮
臍二錢

乾薑

炮錢半

草薢

益智仁

揀參

甘草

炙

官桂

白芍藥

各一錢

吳茱萸

陳皮

白朮

各五分

右咬咀水二盞棗二枚薑三片煎八分食前溫服三

服後大勢去痛減半至秋灸中脘以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣明年復灸三里二七壯亦助胃氣引氣下行仍慎加調攝一年而平復

五味沉附湯

百十七

治虛寒無陽胃弱乾嘔

熟附子

乾薑

炮各一錢

白朮

炙甘草

各錢半

沉香

五分

水盞半薑五片煎七分食前服

二味沉附湯

百十八

治瘴疾上熱下寒腿足寒厥

沉香

磨汁

附子

制各三錢

水一鍾半生薑三片煎八分去粗入沉香汁放冷服
此藥主上熱下寒○全集云沉水真正鐵角 香其
味甘辛者爲美辛辣者性熱附子降氣斂陽治陰毒
冷瘴只一服而回生起死真可以奪化功

濟生

七棗湯

百十九

治瘴瘧或因感冒風寒或是五臟

氣虛陰陽相搏寒多熱少或但寒不熱皆可服

大附子 一枚制分四服○又方用川烏代附子

以水調陳壁土爲糊浸泡七次

水二鍾薑七片棗七枚煎一鍾當發日早晨空心溫服仍喫棗子三五枚忌如常

冷湯

百二十

治瘴毒內寒外熱咽噤間煩躁不解

人參

半兩

大附子

一錢

甘草

炙三寸

淡竹葉

十四片

大棗

五枚

水煎溫服或冷服○甚者宜倍用人參附子不可拘此常數

生薑煎 一二一

治瘴如瘧憎寒壯熱

老生薑一大塊打破濕紙包煨熟

右用水一鍾煎半鍾熱服取微汗

芎附散 一二二

治五種痛痺自腿臂間發作不定者

小川芎

附子

炮去皮

黃芪

防風

白朮

當歸

酒洗

熟地

桂心

甘草

柴胡

等分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分空心服

局方參附滲濕湯 一二三

治坐臥濕地雨露所襲身重

脚弱關節疼痛發熱惡寒小便不利大便澹泄

人參

白朮

茯苓

甘草

附子

炮

乾薑

炮

桂枝

芍藥

等分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分不拘時服

七味滲濕湯 一二四

方在和陣一七四

治寒濕所傷身體重著小便赤澀大便澹泄

熨背散 一二五

治胸痺心背疼痛氣悶

烏頭

細辛

附子

羌活

川椒

桂心

各一兩

川芎

一兩二錢

右爲末以少醋拌勻或炒熟或用帛裹微火炙令煖以熨背上取瘡乃止忌生冷如常服○按此方當用氣惟諸辛香者佳附子似不必用

溫中法麴丸

一二六

治脾痺發欬嘔汁

法麴

炒

枳實

麴炒

白茯苓

吳茱萸

湯浸炒

桂心

厚朴

薑制

當歸

甘草

炙各三兩

人參

麥冬

乾薑炮

細辛

附子炮

桔梗炒各一兩

麥芽微炒五合

右爲細末煉蜜丸桐子大每服七十丸食前熟水下

日三

丹
溪
龍虎丹一二七

治走注疼痛或麻木不仁或半身

疼痛

草烏

蒼朮

白芷各一兩

右爲末水拌發熱過再入乳香二錢當歸牛膝各半

兩酒糊丸彈子大酒化下

活絡丹 一二八

方在和陣二七七

治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰死血者

濟生二至丸 一二九

治老人虛弱腎氣虛損腰痛不可

屈伸

附子 炮去皮
臍

桂心

杜仲 制

補骨脂 炒各
一兩

鹿角霜

鹿角鎔

鹿茸 酒炙

青鹽 另研各
半兩

右爲末酒煮糊丸桐子大每服七十丸空心用胡桃

肉細嚼鹽湯或鹽酒送下如畏熱藥者去附子加肉
蓯蓉

三
因 腎著湯 百三十

治腎虛身重腰冷如在水中不渴

小便自利食飲如故腰下重痛如帶五千錢

茯苓

白朮 各四兩

炙甘草

乾薑

炮各二兩

右咬咀每服四錢水煎空心冷服○一方用薑四兩

朮二兩○良方每服有杏仁五分治妊娠腳腫

韓
氏茵陳附子湯 一三一

治發黃服四逆湯身冷汗不

止者

附子

二個各作八片

乾薑

炮二兩半

茵陳

一兩半

右用水煎分作三服

韓氏

小茵陳湯

一三二

治發黃脉沉細四肢及遍身冷

附子

一個炮作八片

炙甘草

一兩

茵陳

二兩

右用水二升煮一升分作三服

韓氏

茵陳橘皮湯

一三三

治身黃脉沉細數熱而手足

寒喘嘔煩躁不渴者

茵陳

橘皮

生薑

各一兩

白朮

二錢半

半夏

茯苓

各五錢

右用水四升煮取二升放溫分作四服

五鬲散

一三四

方在和陣一五六

治五鬲五噎

十鬲散

一三五

方在和陣一五八

治十般鬲氣

五噎散

一三六

方在和陣一五九

治諸氣結聚胸膈痞悶痰逆惡心飲食不進

良方 白朮聖散子 一三七

治一切瀉痢久不瘥并婦人

產後痢疾

白朮

砂仁

當歸

肉荳蔻

乾薑

炮

陳皮

炙甘草

石榴皮

訶子

芍藥

炒等分

右咬咀每服五錢水一鍾半入乳香一豆大煎八分

食前服

仲景

吳茱萸湯

一三八

嘔而胸滿乾嘔吐涎沫頭痛及

食穀欲嘔者此方主之

吳茱萸

一升

人參

三兩

生薑

六兩

大棗

十枚擘

右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服

良方

吳茱萸湯

一三九

治冒暑伏熱腹痛瀉痢或飲食

過度霍亂吐瀉或食冷冒寒或忍飢大怒或因舟車傷動胃氣令人吐瀉並作轉筋逆冷等證遲則不救

吳茱萸

木瓜

食鹽

各半兩

右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮百沸入藥煎至二升已下傾一盞或冷或熱隨病人之便服之○若卒無前藥止用鹽一撮醋一盞同煎八分溫服或鹽梅鹹酸等物皆可用

吳茱萸散

百四十

治腸痺寒濕內聚腹痛滿氣急大

便飧泄

炮乾薑

炙甘草

吳茱萸

肉苁蓉

麩裹煨

砂仁

神曲

炒各一錢

白朮

厚朴

薑制

陳皮 各二錢
一方有良薑

右爲末每服二錢空心米飲調下

海藏 吳茱萸丸 一四一

治下痢藏府不調脹滿腹痛水

穀不化怠惰嗜臥時時下痢乃陰濕證也

吳茱萸

兩半湯洗炒

神麴

炒五兩

白朮

炒四兩

肉桂

乾薑

炒各二兩半

川椒

去目炒一兩

右爲末糊丸桐子大米飲下三五十丸食前服

楊氏八味湯 一四二

治脾胃虛寒氣滯不行心腹刺痛

藏府虛滑

人參

當歸

炮薑

吳茱萸

湯炮
七次

肉桂

丁香

木香

陳皮

各一錢

右咬咀水一鍾半煎七分溫服無時按此湯味太

剛烈當加炙甘草方妙

仲景真武湯 一四三

治少陰傷寒腹痛小便不利四肢

沈重疼痛自下利者此爲有水氣其人或欬或小便
利或下利或嘔者

茯苓

芍藥

生薑 各三兩

白朮 二兩

附子

一枚炮去皮切八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服
○若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩○小便
利者去茯苓○下利者去芍藥加乾薑二兩○嘔者
去附子加生薑足前成半斤

良方九寶丹 一四四

調理脾胃止泄瀉

人參

白朮 炒

茯苓

炙甘草

乾薑

炮

木香

藿香

去土

訶子

去核

肉苳蔻

麩炒各一錢

水一鍾半加薑煎食遠服

濟生

四桂散

一四五

治本元氣虛眞陽耗散臍腹冷痛

泄瀉不止

人參

附子

炮

白茯苓

木香

各一兩

右咬咀每服五七錢水一鍾半煨薑五片鹽少許食遠煎服○滑泄不止加肉苳蔻訶子名六桂散○活

人有白朮無訶子

仲景白通湯 一四六

治少陰病下利

蔥白 四莖

乾薑 一兩

附子

一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

白通加豬膽汁湯即於前方加人尿五合豬膽汁一合治少陰下利無脉乾嘔而煩者服湯後脉暴出者死微續者生

仲景桃花湯 一四七

治少陰傷寒下利便膿血

赤石脂

一半篩末
一半全用

乾薑 一兩

粳米 一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內所篩
赤石脂細末方寸匕攪勻服之日三服若一服愈餘
勿服

潔古漿水散 一四八

治暴瀉如水周身汗出一身盡冷

脉微而弱氣少不能語者甚者加吐即爲急證

半夏

一兩制

附子

制

炮薑

肉桂

甘草

各五錢

良薑

二錢半

右爲末每服三錢漿水一鍾半煎至半鍾熱服

澹附子茴香散 一四九

治氣虛積冷心腹絞痛泄瀉

食少

人參

白朮

茯苓

炙甘草

各七分

附子

制

炮薑

各五分

茴香

肉苳蔻

各四分

木香

三分

丁香

五粒

水一鍾半煎七分食遠服

本五味子散

百五十

治腎泄在侵晨及五更作瀉飲

食不進不時去後

五味子

炒二兩

吳茱萸

炒一錢

右爲末每服二錢白湯調下爲丸尤效

本

事二神丸 一五一

治脾胃虛寒不思飲食泄瀉不止

肉苳蔻

生用二兩

破故紙

炒四兩

右爲末用大肥棗四十九枚入生薑片四兩同煮以棗爛爲度去薑取棗肉搗藥爲丸桐子大每服五六
十丸白湯下

薛氏四神丸 一五二

治脾腎虛寒大便不實飲食不思

及泄痢腹痛等症

破故

炒四兩

肉苁蓉

麩煨

五味子

各二兩

吳茱萸

湯浸炒一兩

右爲末用大棗百枚同薑八兩煮爛取肉搗丸桐子大每服七八十丸空心食前白湯下○按此丸不宜用棗但以薑汁煮麩糊爲丸更佳

澹

四神丸

一五三

治脾腎泄清晨溏瀉

破故

炒四兩

肉苁蓉

二兩

木香

半兩

小茴香

炒一兩

右爲末薑煮棗肉爲丸桐子大白湯送下

醫林四神丸 一五四

治寒疝脹痛不已

萆澄茄

木香

各半兩

吳茱萸

半酒浸
半醋浸

香附

各一兩

右爲末糊丸桐子大每服七八十九丸空心鹽湯或乳香葱湯任下

集要四神丸 一五五

方在補陣百六十

治小便頻數不禁

五味子丸 一五六

治下元虛寒火不生日以致命門

不煖關門不閉名曰腎泄亦名脾腎泄

人參

白朮

炒

北五味子

炒

破故

炒

各三兩

山藥

炒

白茯苓

各兩半

吳茱萸

湯泡炒

川巴戟

去心炒

肉果

麴煨各一兩

龍骨

右爲末酒糊丸桐子大每服百餘丸食前白湯或米

湯任下

得效
萆撥丸 一五七

治滑泄中寒者宜之

萆撥

川薑

炮

丁香

不見火

附子

炮去皮臍

良薑

胡椒

吳茱萸

湯浸炒
各一兩

山茱萸

草薢

去皮各半兩

煮棗肉丸桐子大每服五六十丸食前陳米飲下日

三服

局方肉苳蔻丸 一五八

治脾胃虛弱脹滿水穀不消臍

腑滑泄

肉苳蔻

麴煨

蒼朮

制

乾薑

炮

厚朴

制

陳皮

各四兩

炙甘草

茴香

炒

肉桂

川烏

炮去皮
臍

訶子肉

各二兩

右用湯浸蒸餅爲丸梧子大每服七八十丸食前白

滾湯下

陳氏

肉苳蔻丸

一五九

方在小兒五六

治腸滑瀉痢

濟生

訶梨勒丸

百六十

治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引

痛飲食不化

訶梨勒

麝
煨

附子

炮

肉苳蔻

麝
煨

木香

吳茱萸

湯泡炒

龍骨

生用

白茯苓

去皮

華撥

各等分

右爲細末生薑汁煮麴糊爲丸梧子大每服七十丸

空心米飲下

良方厚朴丸

一六一

治寒中洞泄實滯脹滿等證

厚朴

炒

乾薑

炒等分

右水拌炒爲末水糊丸桐子大每服五十丸米飲下

百一縮脾丸

一六二

治滑泄不禁

白朮

炒

厚朴

薑炒

赤石脂

肉豆蔻

麴煨

乾薑

炒各一兩

附子

制

華撥

神麴

炒各五錢

右爲細末醋糊丸桐子大每服五七十九空心米飲

下

三桂香丸

一六三

治藏府虛寒爲風寒所搏冷滑注

下不禁危篤者累效

附子

肉苳蓏

麴煨

白茯苓

各一兩

桂心

乾薑

炒

木香

各半兩

丁香

二錢半

右爲末麴糊丸桐子大空心米飲下五七十九

實陳麴丸 一六四

磨積止瀉痢治腹中冷痛

陳麴

一兩半

人參

白朮

炒

當歸

炒

乾薑

肉桂

甘草

炙

厚朴

制各半兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服三五十丸溫酒或淡醋湯任下日二服

楊氏草薢分清飲

一六五

治真元不足下焦虛寒或服

寒涼利藥過多小便白濁頻數無度澄如膏糊等證

益智仁

川草薢

石菖蒲

烏藥

各等分

右咬咀每服五六錢水一鍾入鹽一捻煎七分食前

溫服 一方加茯苓甘草

益智湯

一六六

治腎經虧損遺精白濁四肢煩倦時

發蒸熱等證

鹿茸

酥炙

巴戟肉

枸杞子

熟地黃

茯苓

酒浸

牛膝

酒浸

附子

炮去皮
臍

桂心

不見火

山茱萸

白芍藥

炙甘草

防風

各等分

右每服三錢水一盞薑五分鹽少許同煎空心服

芍
安腎丸 一六七

治腎經積冷下元衰憊目暗耳鳴

四肢無力夜夢遺精小便頻數臍腹撮痛食少體瘦
神困健忘常服壯元陽益腎水

肉桂

去粗皮
不見火

川烏

炮去皮臍
各一斤

白朮

山藥

茯苓

肉蓯蓉

酒浸
炙

巴戟

去心
炙

破故

炒

萆薢

桃仁

麴炒

石斛

炙

白蒺藜

炒去刺
各三斤

右爲末煉蜜丸桐子大每服三五十丸溫酒或鹽湯
下空心食前服○疝氣茴香湯下○三因安腎丸無

茯苓肉桂二味

小安腎丸 一六八

治腎氣虛乏下元冷憊夜多漩溺

體瘦神倦腰膝沉重泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛

川棟子 一斤

用香附子川烏各一斤加鹽四兩

水四升同煮候乾去香附川烏不用取川棟切

焙

小茴

十一兩

熟地

八兩

川椒

四兩

去閉口者微炒出汗

右爲末酒糊丸桐子大每服二三十丸空心臨臥鹽

湯或酒任下

西蜀石刻安腎丸 一六九

治真氣虛憊脚膝軟弱夜夢

遺精小便滑數

附子

制

肉桂

川烏

制

川椒

去目微炒出汗

兔絲

制

巴戟

制

破故

酒炒

赤石脂

煨

遠志

制

茯神

茯苓

蒼朮

米泔浸炒

山茱萸

杜仲

制

石斛

胡蘆巴

炒

柏子仁

韭子

微炒

小茴

酒炒

肉蓯蓉

酒浸

川棟子

酒蒸去核
各二兩

鹿茸

制一兩

青鹽

四錢

山藥

四兩作糊

右爲末酒煮山藥糊丸桐子大每服七八十九空心
鹽湯或白湯下

元戎

小已寒丸

百七十

一名強中丸

治脾胃積冷中

寒洞泄倦怠不思飲食進食止自汗厚腸胃○見肘
後甚驗

艾葉

四兩

蒼朮

一兩炒

吳茱萸

炒

陳皮

炒各二兩

右用米醋二升浸一宿漉出曝乾再於原醋內拌勻炒令紫色焙乾爲末稀糊丸桐子大每服三五十丸空心食前溫酒鹽湯米湯白湯任下

局方

大已寒丸 一七一

治藏府虛寒心腹疔痛腸鳴泄

瀉自利自汗米穀不化手足厥冷陰盛陽衰等證

萆撥

肉桂

各四兩

乾薑

炮

良薑

各六兩

水煮麴糊爲丸桐子大每服二三十丸食前米飲下

元戎

大已寒丸 一七二

治諸沈寒冷秘等證

吳茱萸

官桂

乾薑

良薑

烏頭

附子

右爲末醋糊丸桐子大每服三五十丸米飲下空心
食前日二服無所忌

海藏

已寒丸

一七三

此丸不僭上而陽生於下 治陰

證服四逆輩胸中發躁而渴者或數日大便秘小便
赤澀服此丸上不燥大小便自利

肉桂

附子

炮

烏頭

炮

良薑

乾薑

芍藥

茴香 各等分

右爲末米糊丸桐子大空心溫水下五七十丸或八九十丸食前亦可酒醋糊丸亦可○海藏云已寒上五味雖熱以芍藥茴香潤劑引而下之陰得陽而化故大小便自通如得春和之陽冰自消矣

十補丸

一七四

治腎藏虛冷面黑足寒耳聾膝軟小

便不利等證

附子

炮

五味 各二兩

山藥

山茱萸

丹皮

桂心

鹿茸制

茯苓

澤瀉各一兩

煉蜜丸桐子大每服六七十丸鹽湯下

選百十補丸一七五

治小腸寒疝

附子一大枚

胡蘆巴

木香

巴戟天

川棟肉

玄胡索

官桂

華澄茄

大茴香

破故紙炒各一兩

右爲末酒煮糯米粉糊爲丸桐子大硃砂爲衣空心

酒下五十丸

集神應散 一七六

治寒疝諸疝心腹痛不可忍散氣

開鬱

玄胡索

胡椒

小茴香

等分

右爲末每服二錢酒調下

金匱當歸生薑羊肉湯 一七七

治寒疝腹中痛及脇痛

裏急者

當歸 三兩

生薑 五兩

羊肉 一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒
多者加生薑成一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白朮
一兩如加生薑亦須加水五升煮取三升二合服之
丹溪腎氣丸 一七八 治諸疝痛

小茴香

炒

破故紙

炒

吳茱萸

鹽炒各五錢

胡蘆巴

七錢半

木香

三錢半

右爲末蘿蔔汁丸桐子大鹽湯下五七十丸

百選胡蘆巴丸

一七九

治小腸氣蟠腸氣奔豚疝氣偏

墜陰腫小腹有形如卵上下來去痛不可忍或絞結
遠臍攻刺嘔吐者

胡蘆巴

炒一斤

大巴戟

炒

川烏

炮去皮
各六兩

川楝子

炒十
八兩

茴香

二十兩

吳茱萸

湯浸七次
炒十兩

右爲末酒糊丸桐子大每服十五丸至二十丸空心

溫酒下

東垣丁香棟實丸

百八十

治寒疝氣血留滯

當歸

酒洗

附子

炮

川楝肉

茴香

各一兩

以上咬咀用好酒三升同煮酒盡焙乾爲末每藥末
一兩入

沒藥

丁香

木香

各五分

全蠟

十三個

玄胡索

五錢

右俱爲末拌勻酒糊丸桐子大每服三五十丸加至
百丸空心溫酒送下

苦楝丸 一八一

治奔豚小腹痛神效

川苦楝子

茴香

各二兩

附子

一兩炮去皮臍

右三味用酒二升同煮盡爲度焙乾爲末每藥末一兩入

玄胡索

三錢一作五錢

全蝎

十八個炒

丁香

十八粒

俱爲末和勻酒糊丸桐子大溫酒下五十丸空心服如痛甚煎當歸酒下

良方

三層茴香丸

一八二

治腎與膀胱俱虛邪氣搏結

不散遂成寒疝臍腹疼痛陰丸偏大膚囊壅腫有妨行步或癢癢不止時出黃水浸成瘡瘍或長怪肉或

外腎腫脹冷硬如石日以漸大須溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝煖養腎經凡一應小腸氣寒疝之疾久新不過三料

第一料

舶上茴香 用鹽半兩同炒焦黃和鹽秤用一兩
連下共重四兩

川楝子

炮去核

沙參

洗

木香

各一兩

右爲細末米糊丸桐子大每服二三十丸空心溫酒

或鹽湯下日三服小病一料可安病深者一料纔盡
便可用第二料

第二料

如前方加華撥

一兩

檳榔

五錢

右六味共重五兩半依前糊丸服如前若未愈再服

第三料

第三料

如前方加白茯苓

佳者
四兩

附子

炮去皮臍或
五錢或一兩

右八味共重十兩丸服如前漸加至三四十丸凡小腸氣頻發及三十年者或大如栲栳者皆可消散神效

奪命丹 一八三

治遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛臍

下脹痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕癢等證

吳茱萸

揀淨一斤

分四分用酒醋鹽湯童便各浸一宿

焙乾

澤瀉

淨片二兩酒浸一宿

右爲末酒糊丸桐子大每服五十丸食前溫酒或鹽

湯下

良方奪命丹

一八四

方在婦人六五

治瘀血入胞脹滿難下

萬氏奪命丹

一八五

方在痘疹八二

治痘瘡倒陷鮮毒發痘

外科奪命丹

一八六

方在外科七七

治疔瘡發背惡毒惡證有奪命之功

局方

二氣丹

一八七

治虛寒積冷小便不禁老人虛人

尺脉微弱患此者

硫黃

制研細

肉桂

各二錢半

乾薑

炮

朱砂

研爲衣各二錢

附子

制半兩

右以麴糊丸桐子大每服二十丸空心鹽湯下

局方

半硫丸

一八八

治高年冷秘虛秘及瘕癖冷氣○

簡易曰此潤劑也

半夏 湯泡七次焙乾爲末

硫黃 明淨者研極細用柳木槌子殺過

右等分以生薑汁打糊丸桐子大每服五七十丸用
無灰酒或生薑湯任下

養正丹 一八九

治上盛下虛眩運此藥升降陰陽及

欬逆翻胃霍亂吐瀉中風涎潮不省人事傷寒陰盛
唇青自汗

硫黃 爲末

黑錫 鎔淨

水銀

硃砂 研各一
兩

右將錫鎔化入硫末漸入漸攪爲末再入水銀同搗如硬再於火上微煨又搗勻放冷研極細末糯米糊丸綠豆大每服三十丸空心鹽湯下

局方
黑錫丹 百九十

治痰氣壅塞上盛下虛腎水虧竭

心火炎盛或一應下虛陰寒真頭痛等證及婦人血海久冷無子赤白帶下

黑錫 去滓二兩炒末 硫黃 二兩

肉桂 五錢

附子 炮

木香

沈香

舶茴香

故紙

陽起石

水飛

胡蘆巴

酒浸炒

肉豆蔻

麩裏煨

金鈴子

蒸去皮核各一兩

右用新鐵鉚將錫化開下硫黃末提起以木杵搗極細放地上退火毒同餘藥研一日至黑光色爲度酒糊丸桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服四十九空心薑鹽湯下女人艾棗湯下

局方紅丸子 一九一

和脾胃消宿食去膨脹治大人小

兒脾胃之證極有神效

京三稜

浸軟切片

蓬朮

煨

青皮

橘紅

各五斤

乾薑

炮

胡椒 各三斤

右爲末用醋糊丸桐子大礬紅爲衣每服三十丸食後薑湯送下○小兒臨時加減與服丸治飲食所傷中脘痞滿服之應手而愈○妊婦惡阻嘔吐全不納食百藥不治者惟此最妙可佐二陳湯服之但人疑其墮胎必不信服每易名用之時有神效但恐妊婦偶爾損動未免歸咎此藥是當酌而防之

椒囊法

一九二

辟一切瘴疾時氣風寒時氣

紅川椒

去閉口者

以絳紗囊貯椒兩許懸佩身傍近裏衣處則一切邪氣不能侵犯

椒紅丸

一九三

治元臟傷憊目暗耳聾服此百日覺

身輕少睡足有力是其效也服及三年心智爽悟目明倍常面色紅悅鬚髮光黑

川椒

去目并合口者炒出汗搗取紅一斤

生地黃

搗自然汁熬取濃汁一升

右將生地汁熬至稀稠得所和椒末搗丸梧子大每

空心溫酒下三四十丸合藥時勿令婦人雞犬見○有
詩曰其椒應五行其仁通六義欲知先有功夜間無
夢寐四時去煩勞五臟調元氣明目腰不疼身輕心
健記別更有異能三年精自秘回老返嬰童康強不
思睡九蟲頓消亡三尸自逃避若能久餌之神仙應
可冀

景岳全書卷五十八